

ตัวชี้วัดที่ ๘ อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ

องค์ประกอบ	ความหมาย
กลุ่มตัวชี้วัด	การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ
ชื่อตัวชี้วัด	ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของตัวชี้วัด	๑) บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ หมายถึง บาดแผลสดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใน ๖ ชั่วโมงก่อนได้รับการรักษา ๒) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยาในกลุ่ม ATC ๐๑ ยาชนิดรับประทานและยาฉีด ๓) เก็บข้อมูลการมารับบริการจากแผนกผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน ระบุโรคตาม ICD-๑๐ ที่ระบุข้างล่าง
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้	เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็น
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง	A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกบาดแผลสดจากอุบัติเหตุที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร	B = จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกบาดแผลสดจากอุบัติเหตุทั้งหมด
สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
รหัสโรค/รหัสเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง และตัวหาร	ICD-๑๐ S๐๐-S๐๑, S๐๕, S๐๗-S๐๑๑, S๑๖-S๑๑๑, S๑๒๘-S๑๓๑, S๑๓๘-S๑๔๑, S๑๔๖-S๑๕๑, S๑๕๖-S๑๖๑, S๑๖๖-S๑๗๑, S๑๗๖-S๑๘๑, S๑๘๖-S๑๙๑, S๑๙๖-S๑๙๙, T๐๐-T๐๑, T๐๔-T๐๗, T๐๙.๐-T๐๙.๑, T๑๑.๐-T๑๑.๑, T๑๓.๐-T๑๓.๑, T๑๔.๐-T๑๔.๑, T๑๔.๖-T๑๔.๙, T๒๐-T๒๕, T๒๙-T๓๒, W๕๐-W๖๔, X๐๐-X๑๙, X๒๐-X๒๙, X๓๐-X๓๙
หน่วยวัดของตัวชี้วัด	ร้อยละ
เกณฑ์เป้าหมาย	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๔๐