

คำชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด SP-RDU

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละของการใช้ RAS blockade (ACEI / ARB / Renin inhibitor) ๒ ชนิดร่วมกัน ในการรักษาความดันเลือดสูง

องค์ประกอบ	ความหมาย
กลุ่มตัวชี้วัด	ภาวะความดันเลือดสูง (Essential Hypertension)
ชื่อตัวชี้วัด	ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคความดันเลือดสูงที่ใช้ RAS blockade (ACEIs/ ARBs/Renin inhibitor) ๒ ชนิดร่วมกันในการรักษาโรคความดันเลือดสูง
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของตัวชี้วัด	๑) ผู้ป่วยนอกโรคความดันเลือดสูงตามรหัส ICD-๑๐ I๑๐ Essential (primary) hypertension ๒) การใช้ยา RAS blockade ๒ ชนิดร่วมกัน หมายถึง การสั่งยา RAS blockade ตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไปในการมาพบแพทย์ในวันที่มารับบริการ (visit)
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้	เพื่อประเมินความสมเหตุผลในการเลือกจ่ายากลุ่ม RAS blockade ในการรักษาความดันเลือดสูง
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง	A = จำนวน visit ผู้ป่วยความดันเลือดสูงที่ได้รับการสั่งจ่ายากลุ่ม RAS blockade ได้แก่ ACEIs+ARBs หรือ ACEIs+Renin inhibitor หรือ ARBs+Renin inhibitor $\geq 2$ ชนิด
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร	B = จำนวน visit ผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงที่ได้รับยาลดความดันเลือดกลุ่ม RAS blockade อย่างน้อย ๑ ชนิด
สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
รหัสโรค/รหัสเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง	ICD-๑๐ I๑๐ และ รหัสยา ACEIs หมายถึง ATC Code C๐๙A ACE INHIBITORS, PLAIN และ C๐๙B ACE INHIBITORS, COMBINATIONS รหัสยา ARBs หมายถึง ATC Code C๐๙C ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, PLAIN และ C๐๙D ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, COMBINATIONS รหัสยา Renin inhibitor หมายถึง ATC Code C๐๙XA Renin-inhibitors ๒ ตัวขึ้นไป
รหัสโรค/รหัสเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง: ตัวหาร	ICD-๑๐ I๑๐ และ รหัสยาลดความดันเลือดอย่างน้อย ๑ ชนิด
หน่วยวัดของตัวชี้วัด	ร้อยละ
เกณฑ์เป้าหมาย	เท่ากับร้อยละ ๐