

คำชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด SP-RDU

ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ ๓ ขึ้นไปที่ได้รับยา NSAIDs

องค์ประกอบ	ความหมาย
กลุ่มตัวชี้วัด	การใช้ยาในผู้ป่วยตามกลุ่มโรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease)
ชื่อตัวชี้วัด	ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคไตเรื้อรังระดับ ๓ ขึ้นไปที่ได้รับยา NSAIDs
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของตัวชี้วัด	๑) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ ๓ ขึ้นไป หมายถึง ผู้ป่วยนอกที่ได้รับการวินิจฉัยด้วย ICD-๑๐ N๑๘.๓, N๑๘.๔, N๑๘.๕, N๑๘.๙ ๒) ยา NSAIDs ชนิดรับประทานและชนิดฉีด หมายถึง ATC code M๐๑AA, M๐๑AB, M๐๑AC, M๐๑AE, M๐๑AG, M๐๑AH (NSAIDs and coxibs) ยกเว้น Aspirin code N๐๒BA๐๑
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้	การไม่ใช้ยาที่มีความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ ๓ ขึ้นไป
ตัวตั้ง	A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ ๓ ขึ้นไป (HN) ได้รับยา NSAIDs
ตัวหาร	B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ ๓ ขึ้นไปที่ได้รับยาอย่างน้อย ๑ ชนิด (HN)
สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x ๑๐๐
รหัสโรคที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง	ICD-๑๐ N๑๘.๓, N๑๘.๔, N๑๘.๕, N๑๘.๙ และ ATC code M๐๑AA, M๐๑AB, M๐๑AC, M๐๑AE, M๐๑AG, M๐๑AH (NSAIDs and coxibs)
รหัสโรคที่เกี่ยวข้อง: ตัวหาร	ICD-๑๐ N๑๘.๓, N๑๘.๔, N๑๘.๕, N๑๘.๙
หน่วยวัดของตัวชี้วัด	ร้อยละ
เกณฑ์เป้าหมาย	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๐