

คำชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด SP-RDU

ตัวชี้วัดที่ ๑๗ จำนวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ยา Warfarin/Statis/ Ergot เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว

องค์ประกอบ	ความหมาย
กลุ่มตัวชี้วัด	การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ : สตรีตั้งครรภ์
ชื่อตัวชี้วัด	จำนวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ ยา Warfarin+หรือ Statis หรือ Ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว + ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของตัวชี้วัด	๑) สตรีตั้งครรภ์ หมายถึง สตรีตั้งครรภ์ที่มีารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ที่ระบุโรคตาม ICD-๑๐ Z๓๒.๑, Z๓๓, Z๓๔.๐-๓๔.๙, Z๓๕.๐-๓๕.๙ ๒) ยาที่ห้ามใช้ หมายถึง ยาในรายการยาที่กำหนดห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin หรือ ยากลุ่ม statins หรือยากลุ่ม ergots ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve และได้รับยา warfarin วิธีการดึงข้อมูล: ๑. เมื่อดึงข้อมูลสตรีตั้งครรภ์ในช่วงเวลา ๖ เดือนและได้รับยาที่ควรหลีกเลี่ยงแล้ว ๒. ให้ตัดคนไข้ที่มีประวัติคลอดใน ๖ เดือน (อาจใช้ ICD-๑๐ คลอด หรือ การ review chart ก็ได้) ๓. ตัดผู้ป่วยกรณีที่เป็นต้องใช้ warfarin เช่น ใส่ mechanical heart valve หรือใช้ได้ใน trimester ที่ ๒ หรือ ๓ อาจต้อง review chart
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้	เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับยาที่มีความเสี่ยงในสตรีตั้งครรภ์
ข้อมูลที่ต้องการ	จำนวนสตรีตั้งครรภ์ (HN) ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ warfarin หรือ ยากลุ่ม statins หรือยากลุ่ม ergots ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve และได้รับยา warfarin
รหัสโรค/รหัสเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง	ICD-๑๐ Z๓๒.๑, Z๓๓, Z๓๔.๐-๓๔.๙, Z๓๕.๐-๓๕.๙ และ (Drug code warfarin หรือ ยากลุ่ม statins หรือ ยากลุ่ม ergots) และ (ยกเว้น ICD-๑๐ Z๙๕.๒)
หน่วยวัดของตัวชี้วัด	จำนวน
เกณฑ์เป้าหมาย	เท่ากับ ๐ คน