ตัวชี้วัดที่ ๑๘ อัตราการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating* ในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตามรหัส ICD-๑๐ ตาม RUA-URI)

องค์ประกอบ	ความหมาย
กลุ่มตัวชี้วัด	การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ : ผู้ป่วยเด็ก
ชื่อตัวชี้วัด	ร้อยละการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating ในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของตัวชี้วัด	๑) ผู้ป่วยเด็ก หมายถึง ผู้ป่วยอายุ ๐-๑๒ ปี ที่มารับบริการผู้ป่วยนอก ๒) โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนหรือหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ครอบคลุมโรคตามรหัส ICD-๑๐ ของโครงการ Antibiotic Smart Use, ASU ๓) ยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating หมายถึง cetirizine, desloratadine, fexofenadine, levocetirizine และ loratadine ทั้งชนิดยาเดี่ยวและยาผสม
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้	เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่มีประสิทธิผล
ตัวตั้ง	A = จำนวน visit ที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนหรือหลอดลมอักเสบเฉียบพลันและได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedation antihistamine
ตัวหาร	B = จำนวน visit ที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนหรือหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน URI
สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x ๑๐๐
รหัสโรค/รหัสหัตถการที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง	ICD๑๐ ดังนี้ J๐๐, J๐๑๐, J๐๑๑, J๐๑๒, J๐๑๓, J๐๑๔, J๐๑๘, J๐๑๙, J๐๒๐, J๐๒๙, J๐๓๐, J๐๓๘, J๐๓๙, J๐๔๐, J๐๔๑, J๐๔๒, J๐๕๐, J๐๕๑, J๐๖๐, J๐๖๘, J๐๖๙, J๑๐๑, J๑๑๑, J๒๐๐, J๒๐๑, J๒๐๒, J๒๐๓, J๒๐๔, J๒๐๕, J๒๐๖, J๒๐๗, J๒๐๘, J๒๐๙, J๒๑๐, J๒๑๘, J๒๑๙, H๖๕๐, H๖๕๑, H๖๕๙, H๖๖๐, H๖๖๔, H๖๖๙, H๖๗๐, H๖๗๑, H๖๗๘, H๗๒๐, H๗๒๑, H๗๒๒, H๗๒๘, H๗๒๙ และ Drug code ยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating
รหัสโรค/รหัสหัตถการที่เกี่ยวข้อง: ตัวหาร	ICD๑๐ ดังนี้ J๐๐, J๐๑๐, J๐๑๑, J๐๑๒, J๐๑๓, J๐๑๔, J๐๑๘, J๐๑๙, J๐๒๐, J๐๒๙, J๐๓๐, J๐๓๘, J๐๓๙, J๐๔๐, J๐๔๑, J๐๔๒, J๐๕๐, J๐๕๑, J๐๖๐, J๐๖๘, J๐๖๙, J๑๐๑, J๑๑๑, J๒๐๐, J๒๐๑, J๒๐๒, J๒๐๓, J๒๐๔, J๒๐๕, J๒๐๖, J๒๐๗, J๒๐๘, J๒๐๙, J๒๑๐, J๒๑๘, J๒๑๙, H๖๕๐, H๖๕๑, H๖๕๙, H๖๖๐, H๖๖๔, H๖๖๙, H๖๗๐, H๖๗๑, H๖๗๘, H๗๒๐, H๗๒๑, H๗๒๒, H๗๒๘, H๗๒๙
หน่วยวัดของตัวชี้วัด	ร้อยละ
เกณฑ์เป้าหมาย	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒๐