

KPI template orthopedic

ชื่อตัวชี้วัด (Name of measure)	ร้อยละของผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนได้รับการดูแลรักษาใน รพ.ระดับ M1 – F3
คำนิยาม (Definition)	กระดูกหักไม่ซับซ้อน หมายถึง ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ที่ได้รับการวินิจฉัย (Principle Dx) เป็นกระดูกหักในตำแหน่งที่กำหนด ในครั้งแรกของการดูแลรักษา (first visit) ดังนี้ 1. Close Clavicle (S4200) 2. Close Distal phalanx of finger & thumb (S6250 , S6260, S6270) 3. Close Distal phalanx of toe & big toe (S9240 , S9250) 4. Close Distal end of radius (S5250) 5. Close Distal end of ulna (S5280) การดูแลรักษา หมายถึง ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนด้วยการ ผ่าตัด ,ใส่เฝือก ฯลฯ *หมายเหตุ ตอนนัดติดตามการรักษา (next visit) ให้ใช้รหัส Z09.4 follow - up examination after treatment of fracture
เกณฑ์เป้าหมาย	ร้อยละ 70 ใน รพ.ระดับ M1 – F3
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนในตำแหน่งที่กำหนด ตามICD10 ข้างต้น ในครั้งแรกของการดูแลรักษา (first visit)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกในรายงานข้อมูล 43 แฟ้ม
แหล่งข้อมูล	รายงานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนในตำแหน่งที่กำหนด ตามICD10 ข้างต้น ในครั้งแรกของการดูแลรักษา (first visit) ที่มารับบริการตรวจในโรงพยาบาล ทั้งที่ Admit และไม่ Admit
รายการข้อมูลที่ 2	B = จำนวนผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนในตำแหน่งที่กำหนด ตามICD10 ข้างต้น ที่มีการส่งต่อ
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/A \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	ทุก 3 เดือน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	
ผู้รายงานผลการดำเนินงาน	คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ
หน่วยงานประมวผลผลและจัดทำ ข้อมูล	
ผู้บันทึกข้อมูล	เลขาและผู้ช่วยเลขาบริการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการสุขภาพ