

ชื่อตัวชี้วัด	9.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ รับผิดชอบทั้งหมด ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมระดับความดันได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มีค่าระดับความดัน โลหิต 2 ครั้งสุดท้ายในช่วงประมวลผล <140/90 mmHg
เกณฑ์เป้าหมาย	มากกว่าร้อยละ 50
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม จากระบบ Cockpit
รายการข้อมูล 1	A : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
รายการข้อมูล 2	B : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B)*100
ระยะเวลาประเมินผล	1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563
วิธีการประมวลผล	ประมวลผลจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม จากระบบ Cockpit A : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD , DIAGNOSIS_IPD , CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักแรก = I10 – I15 ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA = 1 หรือ 3 และ PERSON.DISCHARGE = 9 (ไม่จำหน่าย) และ PERSON.NATION = 099 (สัญชาติไทย) และได้รับการ ตรวจ วัดความดันโลหิตสูง 2 ครั้ง ในช่วงประมวลผล โดยใช้ข้อมูลจาก CHRONICFU.SBP BETWEEN 50 and 139 mmHg , CHRONICFU.DBP BETWEEN 50 and 89 mmHg B : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD , DIAGNOSIS_IPD , CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักแรก = I10 – I15 ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA = 1 หรือ 3 และ PERSON.DISCHARGE = 9 (ไม่จำหน่าย) และ PERSON.NATION = 099 (สัญชาติไทย)
เกณฑ์การให้คะแนน	น้อยกว่าร้อยละ 40.00 = 0 คะแนน ร้อยละ 40.00-42.49 = 1 คะแนน ร้อยละ 42.50-44.99 = 2 คะแนน ร้อยละ 45.00-47.49 = 3 คะแนน ร้อยละ 47.50-49.99 = 4 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50.00 = 5 คะแนน